

14.

DE LABIORUM CANCRO.
T H E S E S
ANATOMICÆ ET CHIRURGICÆ;

*QUAS, Deo juvante & Praside M. JOANNE-BAPTISTA-
GUILLELMO FERRAND, Facultatis Artium & Chirurgiæ
Magistro, antiquo Collegii Prasecto, Regio Scholarum Pro-
fessore, Regio Librorum Censore, Primario magni Nosocomii
Parisiensis Chirurgus designato, Regiæ Chirurgiæ Academiæ
Consiliario, antiquo Anatomes & Chirurgiæ in Scholâ Prælicâ
Professore, Imperialis Academiæ Florentinæ Socio extraneo,
Regiæ Scientiarum, Humaniorum Litterarum & Artium Aca-
demiæ Rothomagensis Socio, necnon saluberrimæ Facultatis
Medicinæ in Universitate Remensi Doctore, tueri conabitur
JOANNES-JOSEPHUS-BENEDICTUS MONIER, è loco Sainte
Jalle Sisleronensis, præclaræ Artium Facultatis in almâ Uni-
versitate Parisiensi Magister, Regiæ Galliarum Principis D.D.
LUDOVICÆ in Monasterio San-Dionysiaci Carmelitæ Chirur-
gus ordinarius, necnon privarîi magni Nosocomii Parisiensis
Chirurgi nuper præcipuus Adjutor.*


*Die Luna trigesimo mensis Septembris, anno R. S. H. 1782,
à sesqui-secundâ post meridiem ad septimam.*

P A R I S I I S,
IN REGIIS CHIRURGORUM SCHOLIS:
PRO ACTU PUBLICO
E T
SOLEMNI COOPTATIONE:



*Typis MICHAELIS LAMBERT, Regii Chirurgiæ
Collegii necnon Academiæ Typographi, viâ Cithareâ.*

M. DCC. LXXXII.



D. O. M.

DE LABIORUM CANCRO.

T H E S E S
ANATOMICÆ ET CHIRURGICÆ.

I.

VULTUS concinnâ & sublimi structurâ conspicuus, in quo
supremi Numinis sigillum elegantissimè appositum stupentes
miramur, almæ rerum Parentis Naturæ, miraculum arguit.
Verùm enim verò, quàm amico fœdere sociantur, arduæ frontis
dignitas, triste supercilium, genarum dulce decus, verecunda
oris venustas, oculorum blandè minacium flagrantia! Quàm benè

A ij

4

conveniunt, vultu animæ theatro sedentes, majestas & amor! Labra roseo colore nitentia, ad oris ornamentum, ad blandam faciei venustatem, lepores ac elegantiam purpureo splendore conferunt; vario musculorum motu, varios animi affectus nervosè exprimunt; ad manducandum, bibendum, sugendum, loquendum, miram præstant opem. Sed eheu! nunc atrâ malorum serie inhonestè deturpantur, nunc indecorè dilacerantur, nunc fatalia mortis femina in rosis sanitatis occultata non rarò maturant. Luctuosum istius veritatis testimonium, à *Cancro*, de quo, prælibatâ laborum anatome, fumus dicturi, mutuamur.

I I.

Duo labra, musculis potissimùm corporata, spongioso quodam atque molliusculo texto, quod absque concursu actionis muscularis intumescit quandoquè atque derumescit, conflare videntur. Extùs tegumentis communibus, intùs membranâ oris, sub quâ breves ac exiles ductus, cryptæ aut glandulæ miliares & lenticulares sitæ sunt, obducuntur. Rubicundi labiorum margines, papillis nervosis longiusculis, sibi que invicem arctissimè agglutinatis, componi videntur. Labra epidermide spoliata, & aquâ aliquandiù macerata, copiosissimas nervorum propagines exhibent, hinc mira eorum sensibilitas; superius labrum sub septo nasi, inferius ad radices dentium incisorum, habenulâ quâdam, quam *frenulum* vocant, retinentur.

Variis est, juxta varios auctores, musculorum numerus. Litem dirimat lynceus anatomicus. Labra *orbicularis* constringit cujus fibræ quasi arciformes. Abducunt *Zygomaticus* & *Buccinator*, risores dicti; labra elevat vel *communes duo canini*, vel proprii *incisoriorum* par; deprimunt tandem *triangularis* & *quadratus*. Alii longè plures describunt. Ad labiorum musculos, *pyramidales* nasi & *platysmamyoides* meritò referendi videntur.

Labiorum arteriæ, *coronaria* dictæ, à carotide externâ proce-

dunt; in jugularem externam venæ sese exonerant.

Nervi à maxillari tùm superiori, tùm inferiori & à portione durâ septimi paris originem mutuantur.

I I I.

Cancrum enodare, accuratam ac numeris omnibus absolutam horrendi istius mali definitionem dare, res ardua. Allatas à turbâ auctorum definitiones brevitatís causâ ex consulto omit- tentes, Schirrum & Cancrum, unum eundemque quasi mor- bum esse, cujus varia stadia, variæ conditiones, contendimus.

Diversâ sub specie, multiplici sub formâ, Cancer prodit. Nunc unicum existit, nunc plura fororiantur instar uvæ tuber- cula, dura, renitentia; sæpè dolorem afferunt, quandoquè nullo, aut levissimo dolore stipantur.

Per non definitum temporis intervallum, quâcumque de causâ ingravescente morbo, crescit tumor, in apicem assurgit, discretis in loculis emollitur. Jam cuti non concolor, ater fit, subruher, lividus aut subviolaceus. Hinc & inde circum- fusæ, varicosæ turgescunt venæ. In his rerum angustiis, velut agmine factó, sævissima ingruunt symptomata. Titillans, urens, lacerans, pungens vigilat dolor. Ortí motu spon- taneo collecticia *ichoris* putridi illuvies, cutem arrodit ac subindè, visu miserabile! ulcus patet asperum, oris tumentibus, duris, inversis horridum; acie tabum eructans, irrepit latiusque grassatur, ac foetidissimâ, tenui, fuscâ, nigrâ, quam evomit, sanie, musculos, vasa, nervos, quodcumque aculeo putrido obvium, pessimè irritando, vorat. Æquis passibus læthifera contagio, rodentis veneni populabunda lues fecunda Cancrorum consequentium parens, chronici dolores, acutis- sima tormenta, febris canerosa, &c. sequuntur, quæ ægros, nisi miserrimis illorum rebus succurratur, inimicos inter ignes & asperim o's cruciatus, conficiunt.

Hæc sunt præcipua Cancrī , in *occultum* & in *ulceratum* vulgò bipartiti , phænomena , cujus sedes ferè propria , partes glandulosæ , molles & laxæ , cujus causa materialis , lymphæ.

I V.

È variarum causarum coïtu Cancrum sobolescere , infausta nimis testatur experientia. Hæmorrhoides suppressæ , imminuta vel abolita menstruatio , atra cura ejusque pedisequi melancholici affectus , lymphæ degeneris ac solito crassioris consistentia , solidorum eretismus , vel irritatio à morfu , contusione , puncturâ , laniatu , ab inclementiâ frigoris , à temerariâ ac ineptâ causticorum aut medicamentorum pinguium applicatione , ab eluendæ fœditatis labiorum incuriâ , &c. pro causis tùm internis , tùm externis , promiscuè sumantur.

Fictitium virus ad fabulosam somniorum patriam relegandum , Cancro nascenti non præexistit , non est terribilissimi istius morbi causa. In ipsomet Cancrī gremio , orto motu spontaneo , genitum , ipsiusmet tabis sobolem , istud , tanquam Cancrorum consequentium causam , solummodò reputandum censemus.

Cancrosi vitii causas altius indagari , de genuinâ ejus naturâ ac effectibus differere , extra pensî rationem positum. Qui plura de *Cancro* voluerit , adeat ille luculentam Dissertationem celeberrimi Doctoris *Peyrilhe* , hujusce Collegii Magistri , duplici laureâ ab Academiâ Scientiarum , Humaniorum Litterarum & Arrium Lugdunensi donatam anno 1773 , illiusque jussu , publicè juris factam.

V.

Nascens labiorum Cancer , nunc verruculam mentiens , nunc corneam naturam ac formam induens , tuberculum durum , renitens , quandoquæ crustâ opertum , titillatione , uredine , aut mordaci vellicatu stipatum exhibet ; quod si vetus & ulceratum , ex suprâ

allatâ descriptione diagnosis eruatur ; cave tamen ne allucine-
ris ; tumores enim alterius generis , fucum quandoquè faciunt.

VI.

Pessimi ominis malum tumor cancrusus ; attamen quò mi-
nor recentiorque morbus , eò tutius ac facilius curationem ad-
mittit. Rarò vetulus , latèque serpens , rariùs ulceratus , rari-
simè ulceris degeneris soboles Cancer curationi cedit. Qui re-
cens & qui à causis externis procedit , minùs importat periculi
cæteris paribus , minùs contra artis aculeos recalcitrat , quàm
cancer *per se* , seu à causis internis sponte suâ pullulans. Viri
boni habitûs citiùs ac feliciùs quàm seniores , cachectici , &c.
sanantur.

VII.

Ab omni ævo ad Cancrî eradicationem nihil non fuit ex-
cogitatum. Suppurantia , caustica , aliaque id genus toties non
sejunctè decantata medicamenta , totidem sunt arma debellandæ
Hydræ imparia , quæ nedùm cancrusam molem consumant ,
aut penitùs evellant , è contrâ res ægri in pejus præcipitant.

Idem esto iudicium de ferro ignito ; nisi tamen unâ eâdem-
que applicatione morbus evanescat. Sic pluriès fausto cum suc-
cessu , verruculas , parva tubercula cancrusa summam labiorum
membranulam lambentia , ferro candenti semel tantùm cautis-
simè apposito , & etiam aquâ mercuriali semel aut bis solum-
modò prudentissimè adhibitâ , consumpsimus. Si cancrusa mo-
les latius aut profundius sit diffusa , ferri candentis vim elu-
dendo , cineri dolofo suppositus , ipsimet igni pertinax , ferocior
ac truculentiùs sæviens Cancer renascetur. In tanto rerum
discrimine , aut *blandire* , aut posito possibili , *seca*.

Si cancrusus tumor non latius grassatus , ferrum non respuat

ægri situ ad operationem accommodato, extentoque labio, ad sanum usque æquali tractu solerter secando, Cancrum scalpro abscindat Chirurgus, ità ut si superius (1), litteræ græcæ Λ, si verò inferius, V figuram sectio referat. Cruentitas vulneris oras, Chirurgi minister adducat, & exule acuum acicularumque vanâ supellectile, incarnanti fasciatione (2), curatio absolvenda.

Apparatus postridiè, sequentibusque diebus eluatur; solidorum eduliorum abstinentiam, quietem ac silentium Chirurgus imperet. Quinto sextove die, prudenti manu deligatio solvenda.

Tutissimâ ac lenissimâ hâc methodo, quæ nunc viget, & nobis pluriès prosperè successit, brevì coalescunt vulneris oræ, brevì juxta naturæ artisque vota, morbus tollitur, nec fœda remanet cicatrix.

Quandò Cancri amplitudo adunationis spem ademit, neglecto curiosiori elegantix studio, extirpationem (quoad fieri poterit) celebrandam esse, censemus.

Cùm eo miserix res processerunt, ut morbus ferro evelli nequeat, tunc fonticulis, sedantibus medicamentis, anodynis, vaporationibus antisepticis, regimine congruo, &c. Cancer mitigetur.

(1) Karissimè, si unquam: hoc nondum nobis observare contigit.

(2) Sumitur fascia tres circiter ulnas longa, in duo capita, cujus unum diffinditur, volura, latitudine ad transversum digitum aut amplius pro re narâ, accedens. Fronti immediate applicata, ad nucham pergit, ibique crâtiatim disposita, versus nasum, cavendo ne lædantur aures, reducit. Ubi naribus reffpondet, spissis super genas spleniis propè aures apposis, duplici fissurâ res circiter digitos longa scinditur fascia, ut capitis fissi extremitates, per duo hæc foramina trajectæ, genas adducere & coadunatas vulneris oras, sar firmiter stringere valeant. Tum sub utroque Zygomate, ad nucham redit fascia, ubi iterùm formatâ cruce acubus fixâ, ad frontem pergens caput percurrit. Incarnans illa fasciatio, duobus firmatur linteis, quorum unum à fronte ad occiput, alterum verò ab aure dextrâ ad sinistram ducta, acubus vel filo fixa retinentur.

F I N I S,